

関節機能改善剤

グリオロン® 関節注 25mg

精製ヒアルロン酸ナトリウム関節内注射液
(ガラスアンプル)

成分名表示変更に伴う包装変更のお知らせ

謹啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

「第十五改正日本薬局方第二追補」に基づき、弊社製品「グリオロン®関節注25mg」の添付文書、アンプルラベル及び個装ケースに関して成分名表示の変更を行いましたので下記のとおりご案内申し上げます。

謹白

日本臓器製薬


対象製品

グリオロン関節注25mg


10管包装

包装変更内容

1. 第十五改正日本薬局方第二追補に基づき、成分名表示を変更しました。



2. アンプルラベルの成分名表示とレイアウトを変更しました。 は変更箇所です。



裏面もご覧ください→

3. 個装ケースの成分名表示を変更しました。

は変更箇所です。

現在の10管包装個装ケース

上面

関 2.5mL×10 アンプル

処方せん医薬品 関節機能改善剤

グリオロン 関節注 25mg

ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

1アンプル 2.5mL中

25mg 含有

ヒアルロン酸ナトリウム

日本薬師製薬株式会社

変更後の10管包装個装ケース

上面

関 **表示変更品** 2.5mL×10 アンプル

処方せん医薬品 関節機能改善剤

グリオロン 関節注 25mg

精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

1アンプル 2.5mL中

25mg 含有

精製ヒアルロン酸ナトリウム

日本薬師製薬株式会社

側面

関 関節機能改善剤 2.5mL×10 アンプル

グリオロン 関節注 25mg ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

Articular functional amelioration preparation 2.5mL×10 ampoules

Griolon intraarticular inj. 25mg Sodium hyaluronate Intra-articular Injection

側面

関 関節機能改善剤 2.5mL×10 アンプル

グリオロン 関節注 25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

Articular functional amelioration preparation 2.5mL×10 ampoules

Griolon intraarticular inj. 25mg Purified sodium hyaluronate Intra-articular Injection

裏面

関 処方せん医薬品 関節機能改善剤 2.5mL×10 アンプル

グリオロン 関節注 25mg ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

○変形性関節症、関節腫痛症
○関節リウマチにおける関節腫痛（下記(1)～(4)の基準を全て満たす場合に限る）
(1) 抗リウマチ薬等による治療で全身の病勢がコントロールできていても関節腫痛のある場合
(2) 全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合
(3) 腫痛の症状が軽度から中等症の場合
(4) 炎症のLarsen X線分類がGrade 1からGrade IIの場合

用法 変形性関節症、関節腫痛症
通常、成人1回1アンプル（ヒアルロン酸ナトリウムとして1回25mg）を1週間ごとに連続5回関節腔内又は関節腔（関節腔、関節下滑液室又は上腕二頭筋長頭腱腔）内に投与するが、症状により投与回数を変更する。

関節リウマチにおける関節腫痛
通常、成人1回2.5mL（1アンプル）（ヒアルロン酸ナトリウムとして1回25mg）を1週間ごとに連続5回関節腔内に投与する。

【注射時注意】 本剤は関節腔内に投与するので、厳重な無菌的動作のもとに行うこと。

裏面

関 処方せん医薬品 関節機能改善剤 2.5mL×10 アンプル

グリオロン 関節注 25mg 精製ヒアルロン酸ナトリウム 関節内注射液

○変形性関節症、関節腫痛症
○関節リウマチにおける関節腫痛（下記(1)～(4)の基準を全て満たす場合に限る）
(1) 全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合
(2) 全身の炎症症状がCRP値として10mg/dL以下の場合
(3) 腫痛の症状が軽度から中等症の場合
(4) 炎症のLarsen X線分類がGrade 1からGrade IIの場合

用法 変形性関節症、関節腫痛症
通常、成人1回1アンプル（精製ヒアルロン酸ナトリウムとして1回25mg）を1週間ごとに連続5回関節腔内又は関節腔（関節腔、関節下滑液室又は上腕二頭筋長頭腱腔）内に投与するが、症状により投与回数を変更する。

関節リウマチにおける関節腫痛
通常、成人1回2.5mL（1アンプル）（精製ヒアルロン酸ナトリウムとして1回25mg）を1週間ごとに連続5回関節腔内に投与する。

【注射時注意】 本剤は関節腔内に投与するので、厳重な無菌的動作のもとに行うこと。

4. 当分の間、現行品と区別できるように「表示変更品」と表示します。

10管包装個装ケース



10管包装梱ケース



5. 変更品の出荷時期

包装	製造番号	出荷時期
10管	10003～	平成23年4月中旬以降

※現行製品がなくなり次第、変更製品を出荷させていただきます。
 出荷時期につきましては、流通在庫の状況により変動することがあります。