

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

使用上の注意改訂のお知らせ

2011年8月
日本臓器製薬株式会社

速崩壊型 鎮痛・抗炎症剤 1日1回型

● **メロキシカム 速崩錠 5mg**「日本臓器」 ● **メロキシカム 速崩錠 10mg**「日本臓器」

このたび、標記医薬品の「使用上の注意」を改訂しましたのでお知らせ致します。
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

1. 改訂内容（下線部追加）

新			旧		
3.相互作用 併用注意(併用に注意すること)			2.相互作用 併用注意(併用に注意すること)		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
<u>抗凝固剤</u> <u>トロンピン</u> <u>阻害剤</u> (ダビガトランエテ キシラート等) クマリン系 抗凝固剤 (ワルファリン等) ヘパリン	出血傾向が増強する おそれがあるので、 併用が避けられない 場合は、血液凝固に 関する検査を行うな ど、これら薬剤の効果 を十分観察すること。	これら薬剤は抗凝固 作用を有するためと 考えられる。 また、CYP2C9 による 代謝において、本剤 とワルファリンとの薬 物相互作用が起こる おそれがある。	クマリン系 抗凝固剤 (ワルファリン等) ヘパリン	出血傾向が増強する おそれがあるので、 併用が避けられない 場合は、血液凝固に 関する検査を行うな ど、これら薬剤の効果 を十分観察すること。	これら薬剤は抗凝固 作用を有するためと 考えられる。 また、CYP2C9 による 代謝において、本剤 とワルファリンとの薬 物相互作用が起こる おそれがある。

2. 改訂理由

同一成分薬の使用上の注意改訂に伴い、「併用注意」の項を自主改訂致しました。

《今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.202（平成23年9月）に掲載予定です。》

医薬品添付文書情報は、医薬品医療機器総合機構の情報提供ホームページ（<http://www.info.pmda.go.jp/>）に最新添付文書並びに医薬品安全対策情報（DSU）が掲載されています。あわせてご利用ください