

トアラセット[®]配合錠「日本臓器」を 服用される患者さんへ

トアラセット

トアラセット配合錠「日本臓器」は、トラマドールとアセトアミノフェンという2つの痛み止め成分を1錠中に配合した強めの鎮痛剤です。

トアラセット配合錠「日本臓器」は長引く痛みや歯を抜いた後の痛み止めに用いられます。ジェネリック医薬品ですので安くなっております。

副作用について

眠気

飲み始めの時期にあらわれることがあります。眠気は4～5日でなくなります。眠気が続く場合は、お医者さん・薬剤師さんに相談して下さい。

トアラセット配合錠「日本臓器」を飲んでいるときは、自動車の運転など機械の操作は避けて下さい。

吐き気

飲み始めの時期にあらわれることがあります。1～2週間でなくなると思われますが、おさまらない場合は、お医者さん・薬剤師さんに相談して下さい。吐き気止めのお薬を飲むとおさえることができます。

便秘

飲み始めから服用を中止するまで発症することがあります。便秘薬と一緒に服用していただくことがあります。

眠気は4～5日続きます

吐き気は1～2週間続きます

便秘は飲み始めから服用を中止するまで続くことがあります

1週間目

2週間目

3週間目

裏面もお読み下さい→

服用時の注意

- ・アセトアミノフェンが含まれている他の薬と一緒に服用しないで下さい。
アセトアミノフェンは、薬局で販売されている解熱鎮痛薬や総合感冒薬に含まれていることがあります。ご注意下さい。
- ・飲酒は避けて下さい。アルコールによって副作用が出やすくなります。
- ・1回1錠、1日4回の服用が標準ですが、お医者さんの指示通りに飲んで下さい。
- ・1回2錠、1日4回を越えて服用しないで下さい。
- ・服用間隔は4時間以上空けて下さい。
- ・誤って多く飲んだ場合は、すぐにお医者さん・薬剤師さんに相談して下さい。
- ・自分の判断で服用を中止しないで下さい。

保管について

- ・赤ちゃん・お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・お薬が残った場合は、保管しないで捨てて下さい。
- ・他の人に渡さないで下さい。

トアラセット[®]配合錠「日本臓器」を飲んで、何か気になることがありましたら、お医者さん・薬剤師さんに相談して下さい。