

レボセチリジン塩酸塩 **ドライシロップ**°0.5%「日本臓器」

を服用される患者さんへ



6ヵ月以上1歳未満の
1日の服用量0.25gの実寸大

このお薬は・・・

- 皮膚や鼻のアレルギー症状を和らげます。
- 苦みをおさえた甘い**オレンジ風味**のお薬です。

上手な飲み方

- 水に溶かして飲ませて
ください。



- 溶かした後は、作り置きしないで、すぐに飲ませて
ください。
- 粉のまま服用する場合には、口の中にお薬を残さない
よう、水と一緒に飲ませてください。

裏面もお読みください ➡

飲みにくいときは・・・

少量の飲みもの・食べものに混ぜると飲ませやすくなります

飲みもの



麦茶



牛乳



スポーツ
ドリンク



リンゴ
ジュース



オレンジ
ジュース

食べもの



ヨーグルト



バニラアイス
クリーム



ゼリー



チョコレート
ソース

小児科学会では、お子様への甘い飲みもの・食べものの取り過ぎを控えるよう勧められています。

注意

- 飲みもの・食べものと混ぜたらすぐに飲ませてください。
- 飲みもの・食べものと混ぜたお薬を飲んだあと、できれば、水を飲ませてください。