

表紙

10枚つづり

患者さん用説明書

経皮鎮痛消炎剤

ジクロフェナクNa ゲル



販 売 **日本臓器製薬株式会社**
大阪市中央区平野町2丁目1番2号


製造販売元 **東光薬品工業株式会社**
東京都足立区新田2丁目16番23号

オモテ

患者さんへ

ジクロフェナクNaゲル

1回当たり使用量



使用回数
1日3～4回

使用方法

- 痛いところとその周辺に、まんべんなくうすくぬり広げてください。
- お風呂上がりに使用すると、より効果的です。

ウラ

ご注意

- 眼・口などの粘膜・きず口には使用しないでください。
- お薬の付いた手で、顔・きず口などに触れると、ヒリヒリとした刺激感が発生しますので、ご使用後はよく手を洗ってください。
- お薬をぬった後、皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 厚くぬると、お薬が乾いて白く見えることがあります。品質には問題ありませんので、安心して引き続きご使用ください。
- お薬をぬりひろげた上からラップなどで、おおわないでください。
- お薬がプラスチックなどを軟化したり、装身具や家具などの塗料を溶かすことがありますので、ご注意ください。
- ご使用後はキャップをしめ、直射日光をさけて、涼しいところに保管してください。
- 子供の手のとどかないところに保管してください。
- アルコール(イソプロパノール)を配合していますので火気に近づけないでください。

日本臓器製薬

サイズ：タテ×ヨコ=120×80mm



B4→ 100%

THE FIRST DATE : 2010.07.16
THE LAST DATE : 2010.07.22_04