

表紙


5枚つづり

患者さん用説明書

外用鎮痛消炎剤

ジクロフェナクNa ローション

微香性/広口塗布面



販売 日本臓器製薬株式会社
大阪市中央区平野町2丁目1番2号

製造販売元 東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

オモテ

患者さんへ


ジクロフェナクNaローション

特徴

- 塗布面のスポンジは、大きめサイズです。
- におい控え目な微香性のローション剤です。

薬液の出し方

- スポンジ面を下向きに押し当てて、容器内の薬液をスポンジ面にしみこませてからお使いください。
- スポンジ面が乾いたら、容器内の薬液をスポンジ面にしみこませる手順を繰り返してください。



下向きに押し当てる

ぬる部位

- 痛いところとその周辺にぬってください。
- ひざやひじの痛みには、その周囲全体にぬってください。
- お風呂上がりに使用すると効果的です。

ウラ

1回あたり使用量

痛いところとその周辺に2～3度重ねぬりします。

使用回数

1日3～4回

ご注意

- 眼や口などの粘膜、きず口には使用しないでください。
- お薬に触れた手で、顔、きず口などに触れると、しみたり、ヒリヒリとした刺激感が発生しますので、ご使用後はお薬のついた手を洗ってください。
- 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合はご使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- お薬を塗った上からラップなどでおおわないようにしてください。
- お薬により、装身具や家具などの塗料が溶けたり、プラスチックを軟化させることがあります。お薬の入っている容器には無影響です。
- ご使用後はキャップをしめ、直射日光をさけ、涼しいところに保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- エタノールを配合していますので火気に近づけないでください。

日本臓器製薬