

規制区分・貯法等一覧

■医療用医薬品

2021.04 現在

販売名	規制区分				日本薬局方	使用期限	貯法	
	特定生物由来製品	生物由来製品	劇薬	処方箋医薬品				
イコサペント酸エチルカプセル 300mg「日本臓器」					●	3年	室温保存(1～30℃) アルミ袋開封後は高温、湿気、光を避けて保存	
イコサペント酸エチル粒状カプセル 300mg「日本臓器」 イコサペント酸エチル粒状カプセル 600mg「日本臓器」 イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg「日本臓器」					●	3年	室温保存(1～30℃)	
オロパタジン塩酸塩ドライシロップ1%「日本臓器」						3年	気密容器 室温保存(1～30℃)	
ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」					●	3年	室温保存(1～30℃)	
ジクロフェナク Na クリーム 1%「日本臓器」						3年	室温保存(1～30℃)	
ジクロフェナク Na ゲル 1%「日本臓器」						3年 チューブ開封後はなるべく速やかに使用すること	室温保存(1～30℃) 火気に近づけないこと	
ジクロフェナク Na テープ 15mg「日本臓器」 ジクロフェナク Na テープ 30mg「日本臓器」						2年 アルミ袋開封後はなるべく速やかに使用すること	室温保存(1～30℃) 遮光したアルミ袋	
ジクロフェナク Na パップ 70mg「日本臓器」 ジクロフェナク Na パップ 140mg「日本臓器」						2年 内袋開封後はなるべく速やかに使用すること	室温保存(1～30℃) 遮光した気密容器	
ジクロフェナク Na ローション 1%「日本臓器」						3年	室温保存(1～30℃) 火気に近づけないこと	
ツートラム錠 50mg ツートラム錠 100mg ツートラム錠 150mg			●	●		3年	室温保存	
トアラセット配合錠「日本臓器」			●	●		3年	室温保存(1～30℃)	
ノイロトロピン錠 4単位						4年	室温保存(1～30℃) アルミ袋開封後は防湿・しゃ光 光により色素が退色することがあるので、アルミ袋開封後は注意すること	
ノイロトロピン注射液 1.2単位		●		●		4年	室温保存(1～30℃) 開封後はしゃ光	
ノイロトロピン注射液 3.6単位		●		●		4年	室温保存(1～30℃) 開封後はしゃ光	
バラシクロビル錠 500mg「日本臓器」					●	●	3年	室温保存(1～30℃)
ヒスタグロビン皮下注用	●				●		3年	2～10℃に保存(凍結を避ける)
ビーマス配合錠						PTP:5年 バラ:3年	室温保存(1～30℃) アルミ袋開封後は防湿・しゃ光	
ファムシクロビル錠 250mg「日本臓器」 ファムシクロビル錠 500mg「日本臓器」					●	3年	室温保存(1～30℃) アルミ袋開封後はしゃ光	
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 「日本臓器」28噴霧用/56噴霧用/112噴霧用						3年	室温保存(1～30℃)	
フロラズ点鼻液 50μg 28噴霧用/56噴霧用/112噴霧用						3年	室温保存(1～30℃)	
ヘパアクト配合顆粒					●	3年	室温保存(1～30℃) 遮光した気密容器	
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」						3年	室温保存(1～30℃)	
メトトレキサート錠 2mg「日本臓器」			●	●		3年	室温保存	
メナテトレノンカプセル 15mg「日本臓器」						3年	室温保存(1～30℃) アルミ袋又はボトル開封後は高温・湿気・光を避けて保存	
メロキシカム速放錠 5mg「日本臓器」 メロキシカム速放錠 10mg「日本臓器」			●			5年	室温保存(1～30℃) アルミ袋開封後は吸湿注意	

販売名	規制区分				日本薬局方	使用期限	貯法
	特定生物由来製品	生物由来製品	劇薬	処方箋医薬品			
モンテルカストチュアブル錠 5mg「日本臓器」					●	3年 使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること	遮光、室温保存(1~30℃) 開封後は、湿気を避けて保存すること
モンテルカストナトリウム錠 5mg「日本臓器」 モンテルカストナトリウム錠 10mg「日本臓器」					●	3年 使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること	遮光、室温保存(1~30℃) 開封後は、湿気を避けて保存すること
レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg「日本臓器」				●		30ヶ月	室温保存
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「日本臓器」						3年	
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ 0.5%「日本臓器」				●		3年	気密容器 室温保存(1~30℃)
ロキソプロフェン Na テープ 50mg「日本臓器」 ロキソプロフェン Na テープ 100mg「日本臓器」						3年 アルミ袋開封後はなるべく速やかに使用すること	室温保存(1~30℃) 遮光したアルミ袋に保存

■医療機器

インテگران	高度管理医療機器 (クラスIV)	3年	高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で保存すること
---------	---------------------	----	--------------------------------