

「ツートラム[®]錠」を飲まれる患者様へ



このお薬は、1回の服用で12時間鎮痛効果が持続するようにつくられた持続性の小型錠で、1日2回の服用で24時間痛みを和らげます。

このお薬は、痛い時だけではなく一定期間飲みつづけていただくことで効果をあらわします。

副作用について

●吐き気・嘔吐



飲み始めたころにあらわれることがあります。
吐き気止めのお薬と一緒に飲むことで吐き気を防ぎます。通常1～2週間ほどで吐き気止めと一緒に飲む必要がなくなります。

●便秘



飲み始めたころにあらわれたり、便秘の症状が悪くなることがあります。下剤と一緒に飲むことで、便秘を防ぎます。

●眠気



飲み始めたころにあらわれることがあります。
眠気は通常数日で自然になくなります。ツートラム錠を飲まれている時は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

●めまい



飲み始めたころにあらわれることがあります。
ツートラム錠を飲まれている時は、眠気の注意と同様に自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

「ツートラム[®]錠」を正しく飲んでいただくために




●ツートラム錠は表と裏で色が違います。

プラスチックシートは表  が上を向いている錠剤と、裏  が上を向いている錠剤が入っています。どちらも同じお薬です。



●この錠剤は、速く溶けて効果をあらわす**速放部**と、ゆっくり溶けて効果をあらわす**徐放部**の2層になっています。飲まれる際に、割ったり、かみくだいたりすると、お薬が早く溶けて、重い副作用があらわれることがありますのでご注意ください。



●医師から指示された量で痛みがとれなかったり、気になる症状がある場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

●医師の指示どおりに飲んでください。

朝・晩の食後もしくは食前や寝る前など医師の指示どおりに飲んでください。飲み忘れた場合は、医師又は薬剤師に相談してください。ご自身の判断で飲む回数や量を変更しないでください。


●ツートラム錠はシートから出して飲んでください。



保管について

- 他の人には決して渡さないでください。
- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。冷蔵庫に保管しても構いません。
- お薬が残った場合は、捨ててください。

- 直射日光や高温・湿気を避けて保管してください。



「ツートラム錠」を飲んで、何か気になることがありましたら、お医者さん、薬剤師さんに相談してください。