

抗リウマチ剤

メトトレキサート錠2mg「日本臓器」

— 新発売のご案内 —

謹啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、抗リウマチ剤『**メトトレキサート錠2mg「日本臓器」**』を新発売することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

— 記 —

販売名	メトトレキサート錠2mg「日本臓器」
成分・含量（1錠中）	日局 メトトレキサート2mg含有
効能・効果	関節リウマチ 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬 関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 関節症状を伴う若年性特発性関節炎
用法・用量	関節リウマチ 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬 関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2～3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。 なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量として16mgを超えないようにする。 関節症状を伴う若年性特発性関節炎 通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして4～10mg/m ² とし、1週間単位の投与量を1回又は2～3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。 なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減する。
貯法	室温保存。
使用期限	3年。

【コード等】

販売名	メトトレキサート錠2mg「日本臓器」	
包装容量	20錠（2錠×10）	24錠（3錠×8）
統一商品コード	174-17201-5	174-17203-9
G S 1（調剤包装単位）	(01) 04987174172008	(01) 04987174172022
G S 1（販売包装単位）	(01) 14987174172012	(01) 14987174172036
レセプト電算処理システムコード	622841001	622841001
薬価基準収載医薬品コード	3999016F1014	3999016F1014
規格単位 / 薬価	2mg1錠 / 85. ⁷⁰ 円	2mg1錠 / 85. ⁷⁰ 円
包装薬価	1,714. ⁰⁰ 円	2,056. ⁸⁰ 円
新発売日	2021年2月5日	