



ノイトロピン錠


を飲まれる患者さんへ

- ノイトロピン錠は、痛い時だけに飲むお薬ではありません。
- ノイトロピン錠は、人の体にもともと備わっている^{そな}痛みを抑える神経の働きを少しずつ回復させますので、効果があらわれるまで2~4週間飲み続けてください。

痛みは、痛みを伝える神経
を通して脳に伝達され、脳で
痛みを感じます。

ノイトロピン錠は、人の体
にもともと備わっている**痛み**
を抑える神経の働きを少
ずつ回復させて痛みを治
すお薬です。

すぐに効く「痛み止め」では
ありません。2~4週間飲み
続けてください。



- 医師の指示どおり、継続して飲んでください。
- ご自身の判断で服用回数や錠数を変更しないでください。



ナイトロピン[®]錠の飲み方

- 通常、1回2錠を1日2回朝夕、食後もしくは食前に飲んでください。
年齢、症状によって服用回数や錠数が変わることがあります。
- 飲み忘れた時は、1回分を早めに飲んでください。

副作用について

次のような症状に気づいたら、飲むことをやめて医師又は薬剤師に相談してください。


- 発^{ほっ}しん、じんましん、かゆみ
- お腹が気持ち悪い、お腹がはる、むかむかする、
吐^はきそうになる、吐^はく、食欲がない

保管について

- 日光・室内灯・高温・湿気を避けて錠剤シートを保管してください。

光により錠剤の色がうすくなったり、湿気によりにおいが出ることがあります。冷蔵庫に保管しても構いません。

- 乳幼児、子供の手の届かないところに保管してください。



ナイトロピン[®]錠を飲んで、何か気になることがありましたら、
医師又は薬剤師に相談してください。