

医療機関 各位

日本臓器製薬

新発売のご案内

抗リウマチ剤

メトトレキサート錠 1mg「日本臓器」

謹啓 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、**メトトレキサート錠 1mg「日本臓器」**を新発売することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

謹白

1. 新発売予定日

2023年8月21日（月）

2. 製品概要

販売名	メトトレキサート錠 1mg「日本臓器」
成分・含量（1錠中）	日局 メトトレキサート 1mg含有
効能・効果	関節リウマチ 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬 関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 関節症状を伴う若年性特発性関節炎
用法・用量	関節リウマチ 局所療法で効果不十分な尋常性乾癬 関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして 6mgとし、1週間単位の投与量を1回又は2~3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。 なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減するが、1週間単位の投与量として16mgを超えないようにする。 関節症状を伴う若年性特発性関節炎 通常、1週間単位の投与量をメトトレキサートとして4~10mg/m ² とし、1週間単位の投与量を1回又は2~3回に分割して経口投与する。分割して投与する場合、初日から2日目にかけて12時間間隔で投与する。1回又は2回分割投与の場合は残りの6日間、3回分割投与の場合は残りの5日間は休薬する。これを1週間ごとに繰り返す。 なお、患者の年齢、症状、忍容性及び本剤に対する反応等に応じて適宜増減する。
貯法 / 使用期限	室温保存 / 3年

※裏面もご確認ください。

3. コード等

販売名	メトレキサート錠 1mg「日本臓器」
包装容量	PTP 24 錠 (3 錠×8)
統一商品コード	174-17101-8
GS1 コード (調剤包装単位)	(01)04987174171001
GS1 コード (販売包装単位)	(01)14987174171015
レセプト電算処理システムコード	622945001
薬価基準収載医薬品コード	3999016F2029
規格単位 / 薬価	1mg 1 錠 / 42.20 円
包装薬価	1,012.80 円
薬価基準収載日 (薬価基準適用日)	2023 年 6 月 16 日

【お問い合わせ先】日本臓器製薬株式会社 くすりの相談窓口 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

フリーダイヤル : 0120-630-093 TEL : 06-6233-6085

FAX : 06-6233-6087 電子メール : okusuri@nippon-zoki.co.jp