

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意改訂のお知らせ

慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤
トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合錠

トアラセット[®]配合錠「日本臓器」

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび上記製品の「使用上の注意」の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂箇所】

(下線部：改訂箇所)

改訂前			改訂後		
10.2 併用注意（併用に注意すること）			10.2 併用注意（併用に注意すること）		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
リネゾリド	(略)	(略)	リネゾリド	(略)	(略)
カルバマゼピ ン(略)	(略)	(略)	<u>メチルチオニ ニウム塩化物 水和物(メチレ ンブルー)</u>	<u>セロトニン症候群(錯乱、 激越、発熱、発汗、運動失 調、反射異常亢進、ミオク ローヌス、下痢等)があら われるおそれがある。</u>	<u>メチルチオニウ ム塩化物水和物の モノアミン酸化酵 素阻害作用により セロトニン作用が 増強される。</u>
			カルバマゼピ ン(略)	(略)	(略)

【改訂理由】

先発品の自主改訂に伴い、「10.2 併用注意」の項を改訂しました。

今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.329に掲載予定です。

なお、改訂後の電子添文は、

PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)

及び弊社ホームページ (https://www.nippon-zoki.co.jp/medical/products.html#title_ta) に掲載されています。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を利用し、下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただくことも可能です。

●GS1 バーコード



(01)04987174137007

【お問い合わせ先】 日本臓器製薬株式会社 くすりの相談窓口（土・日・祝日及び当社休日を除く 9:00～17:00）

フリーダイヤル：0120-630-093 TEL：06-6233-6085

FAX：06-6233-6087 電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp