

規制区分・貯法等一覧

■医療用医薬品

2024.4 現在

販売名	規制区分				日本薬局方	使用期限	貯法	取扱い上の注意 (電子添文第 20 項より)
	特定生物由来製品	生物由来製品	劇薬	処方箋医薬品				
オロパタジン塩酸塩ドライシロップ 1% 「日本臓器」						3 年	室温保存	開封後は湿気を避けて遮光して保存すること。
ケトコナゾール外用ポンプスプレー2% 「日本臓器」					●	3 年	室温保存	1.小児の手の届かない所に保管すること。 2.火気を避けて保管すること。 3.合成樹脂を軟化したり、塗料を溶かすことがあるので注意すること。
ジクロフェナク Na クリーム 1%「日本臓器」						3 年	室温保存	-
ジクロフェナク Na ゲル 1%「日本臓器」						3 年	室温保存	1.火気を避けて保存すること。 2.合成樹脂を軟化させたり、塗料を溶かしたり、金属を変色させるおそれがあるので注意すること。
ジクロフェナク Na テープ 15mg「日本臓器」 ジクロフェナク Na テープ 30mg「日本臓器」						2 年	室温保存	-
ジクロフェナク Na パップ 70mg「日本臓器」 ジクロフェナク Na パップ 140mg「日本臓器」						2 年	室温保存	-
ジクロフェナク Na ローション 1%「日本臓器」						3 年	室温保存	1.火気を避けて保存すること。 2.合成樹脂を軟化させたり、塗料を溶かしたり、金属を変色させるおそれがあるので注意すること。
ツートラム錠 25mg ツートラム錠 50mg ツートラム錠 100mg ツートラム錠 150mg			●	●		4 年	室温保存	PTP シート又は容器開封後は、高温高湿を避けて保存すること。
トアラセット配合錠「日本臓器」			●	●		3 年	室温保存	-
ノイロトロピン錠 4 単位						4 年	室温保存	アルミピロー開封後は、防湿・遮光をして保存すること。光により退色する可能性がある。
ノイロトロピン注射液 1.2 単位		●		●		4 年	室温保存	外箱開封後は遮光して保存すること。
ノイロトロピン注射液 3.6 単位								
バラシクロビル錠 500mg「日本臓器」				●	●	3 年	室温保存	-
ヒスタグロビン皮下注用	●			●		製造日から 3 年	2～10℃に保存	1.凍結を避けること。 2.本剤は特定生物由来製品に該当することから、本剤を使用した場合は、医薬品名(販売名)、その製造番号又は製造記号(ロット番号)、使用年月日、使用した患者の氏名、住所等を記録し、少なくとも 20 年間保存すること。

販売名	規制区分				日本薬局方	使用期限	貯法	取扱い上の注意 (電子添文第20項より)
	特定生物由来製品	生物由来製品	劇薬	処方箋医薬品				
ピーマス配合錠						5年	室温保存	アルミピロー開封後は、防湿・遮光をして保存すること。
ファムシクロビル錠 250mg「日本臓器」 ファムシクロビル錠 500mg「日本臓器」				●		3年	室温保存	1.アルミピロー開封後、光を避けて保存すること。本剤は光により変色することがある。変色したものは使用しないこと。 2.アルミピロー開封後、湿気を避けて保存すること。
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg「日本臓器」112 噴霧用						3年	室温保存	-
ヘパアクト配合顆粒					●	3年	室温保存	-
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 「日本臓器」						3年	室温保存	-
メトレキサート錠 1mg「日本臓器」 メトレキサート錠 2mg「日本臓器」			●	●		3年	室温保存	-
モンテルカストチュアブル錠 5mg 「日本臓器」					●	3年	室温保存	アルミ袋開封後は、湿気を避けて保存すること
モンテルカストナトリウム錠 5mg モンテルカストナトリウム錠 10mg					●	3年	室温保存	アルミ袋開封後は、湿気を避けて保存すること
レボセチリジン塩酸塩錠 2.5mg「日本臓器」						30 箇月	室温保存	-
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg「日本臓器」					●	3年		
レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ 0.5% 「日本臓器」				●		3年	室温保存	-

■医療機器

インテگران	高度管理医療機器 (クラスⅣ)	3年	高温多湿、直射日光を避け、できるだけ清潔な環境で保存すること
---------	--------------------	----	--------------------------------