

ストレキサート錠2mg「日本臓器」を服用される患者さんへ



このお薬は **関節リウマチ** の治療薬です

- このお薬は、1週間のうちお薬を飲まない期間があります。
- このお薬は、医師の指示どおり下記のいずれかの飲み方を繰り返してお飲みください。
- それぞれ1回で飲むお薬の量は、医師または薬剤師の指示にしたがってください。

飲み方 医師、薬剤師の先生は、以下の3つから患者さんの飲み方の□に印をお書きください。

□1回で飲む場合

1日目(飲み始めの日)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
朝							朝	
飲む	← お薬を飲まない期間 →						飲む	←


□2回に分けて飲む場合

1日目(飲み始めの日)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
朝 夕							朝 夕	
飲む ← 12時間あける → 飲む	← お薬を飲まない期間 →						飲む ← 12時間あける → 飲む	←


□3回に分けて飲む場合

1日目(飲み始めの日)	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目
朝 夕	朝						朝 夕	朝
飲む ← 12時間あける → 飲む ← 12時間あける → 飲む	飲む ← 12時間あける → 飲む	← お薬を飲まない期間 →					飲む ← 12時間あける → 飲む ← 12時間あける → 飲む	

お薬のシート



- お薬のシートに書かれた月日・曜日・朝夕のとおりにお飲みください。
- 下の図のように、谷折りにしてお薬を押し出してください。



- このお薬は、効果が得られるまでに1～2か月かかる場合があります。ご自分の判断でお薬の量を増減したり、お薬を飲むのをやめたりしないでください。
- お薬を飲み忘れた場合はそのお薬を飲まず、次回飲む時から決められた量をお飲みください。また、誤ってお薬を多く飲んだ場合は、すぐに医師または薬剤師に相談してください。
- コップ1杯の水またはそれ以上の多めの水でお飲みください。
- 他の医療機関を受診される場合は、このお薬を飲んでいる事を医師または薬剤師にお伝えください。

次のような症状は副作用の可能性があります
症状に気づいたらお薬の服用をやめ、すぐに医師または薬剤師に相談してください

からだがだるい、疲れやすい、
吐き気、口内炎、食欲がない、
口が強くかわく等



発熱、せき、
喉の痛み、頭痛、
息切れ、息苦しい
等



青あざ、皮下出血、出血しやすい(鼻血、歯茎の出血など)等

他に むくみ、尿量の減少、めまい、発疹、かゆみ、皮膚の赤み、水ぶくれ、皮膚や白目が黄色くなる、下痢等

生活する上での注意

- このお薬は、流産や胎児の奇形を起こす可能性があります。ご自身もしくはパートナーの妊娠、出産を希望する方は、女性、男性ともに医師に相談してください。
- このお薬を飲んでいる間は、飲酒を控えてください。
- 医師の指示にしたがって定期的に検査を受けてください。
- このお薬を飲んでいる間は、生ワクチン【麻疹・風疹・おたふくかぜ・みずぼうそう・ポリオ・BCG】の接種はできません。接種の必要がある場合には医師に相談してください。

次の方は医師に相談してください

- 妊娠を希望する方・妊娠中・授乳中の方。
- 血液・肝臓・腎臓の病気がある方、肺の病気になった方、感染症やみずぼうそうにかかっている方、アルコールを日頃から飲まれている方。
- 今までにお薬による発疹などのアレルギーが出たことがある方。
- 他にお薬を飲んでいる方。

その他、このお薬に関するお問い合わせは担当の医師か薬剤師に相談してください。

病院または薬局の連絡先 _____

日本臓器製薬