# メトトレキサート錠2mg「日本臓器」を服用される患者さんへ



このお薬は 関節リウマチ の治療薬です

- このお薬は、1週間のうちお薬を飲まない期間があります。
- 1週間のうち決められた日に決められた量をお飲み下さい。

## 飲み方の例

#### □1回で飲む場合

1日目(飲み始めの日)							
朝	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	
飲む	<b>◆</b> お薬を飲まない期間 <b>→</b>						

#### □2回に分けて飲む場合

1日目(飲み始めの日)		0.55					
朝	タ	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
飲む◆ 12時間 <sub>あける</sub> <b>&gt;</b> 飲む ◆							-

#### □3回に分けて飲む場合

1日目(飲み始めの日)		2日目					
朝	タ	朝	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
飲む◆12時間あける ◆飲む◆12時間あける ◆飲む		<b>◆</b> お薬を飲まない期間 <b>→</b>					



- ●効果が得られるまでに1~2か月かかる場合があります。ご自分の判断でお薬の量を増減したり、お薬を飲むのをやめたりしないで下さい。
- お薬を飲み忘れた場合そのお薬は飲まず、次回飲む時から決められた量だけお飲み下さい。 また、誤ってお薬を多く飲んだ場合は、すぐに医師または薬剤師に相談して下さい。
- コップ1杯の水またはそれ以上の多めの水でお飲み下さい。
- 他の医療機関を受診される場合は、このお薬を飲んでいる事を医師または薬剤師にお伝え下さい。

#### 次のような症状に気づいたら服用をやめ、すぐに医師または薬剤師に相談して下さい

からだがだるい、疲れやすい、 吐き気、口内炎、食欲がない、 口が強くかわく等



発熱、せき、 喉の痛み、頭痛、 息切れ、息苦しい 等



青あざ、皮下出血、出血しやすい(鼻血、歯茎の出血など)等

他に むくみ、尿量の減少、めまい、発疹、かゆみ、紅斑、水ぶくれ、皮膚や白目が黄色くなる、下痢等

### 生活する上での注意

- このお薬を飲んでいる間は、女性は妊娠を避けて下さい。男性でこのお薬を飲んでいる方は、配偶者が妊娠しないように注意して下さい。
- ●このお薬を飲んでいる間は、飲酒を控えて下さい。
- ●医師の指示にしたがって定期的に検査を受けて下さい。
- このお薬を飲んでいる間は、生ワクチン【麻疹・風疹・おたふくかぜ・みずぼうそう・ポリオ・ BCG】の接種はできません。接種の必要がある場合には医師に相談して下さい。

#### 次の方は医師に相談して下さい

- ●妊娠中・授乳中・妊娠を希望する方。
- 血液・肝臓・腎臓の病気がある方、肺の病気になった方、感染症やみずぼうそうにかかっている方、 アルコールを日頃から飲まれている方。
- 以前にお薬を飲んで発疹などのアレルギーが出た事がある方。
- 他にお薬を飲んでいる方。

その他、このお薬に関するお問い合わせは担当の医師か薬剤師に相談して下さい。