

2020年6月吉日

医療機関 各位

日本臓器製薬株式会社

〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1番2号  
http://www.nippon-zoki.co.jp/

持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤

## レボセチリジン塩酸塩 **ドライシロップ<sup>®</sup>0.5%**「日本臓器」

### — 新発売のご案内 —

謹啓

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より弊社ならびに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、持続性選択 H<sub>1</sub> 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤『レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ 0.5%「日本臓器」』を新発売することとなりましたのでご案内申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

販売名	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」
成分・含量（1g中）	レボセチリジン塩酸塩5mg含有
効能・効果	成人：アレルギー性鼻炎 蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症 小児：アレルギー性鼻炎 蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒
用法・用量	成人：通常、成人には1回1g（レボセチリジン塩酸塩として5mg）を1日1回、就寝前に用時溶解して経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、最高投与量は1日2g（レボセチリジン塩酸塩として10mg）とする。 小児：通常、6ヵ月以上1歳未満の小児には1回0.25g（レボセチリジン塩酸塩として1.25mg）を1日1回用時溶解して経口投与する。 通常、1歳以上7歳未満の小児には1回0.25g（レボセチリジン塩酸塩として1.25mg）を1日2回、朝食後及び就寝前に用時溶解して経口投与する。 通常、7歳以上15歳未満の小児には1回0.5g（レボセチリジン塩酸塩として2.5mg）を1日2回、朝食後及び就寝前に用時溶解して経口投与する。
貯法	気密容器、室温保存（1～30℃）。
使用期限	2年6ヵ月。

### — コード等 —

販売名	レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ0.5%「日本臓器」	
包装容量	分包：0.5g × 100包	バラ：100g
統一商品コード	174-43103-7	174-43101-3
GS1（調剤包装単位）	(01) 04987174431020	(01) 04987174431006
GS1（販売包装単位）	(01) 14987174431034	(01) 14987174431010
レセプト電算処理システムコード	622804101	622804101
薬価基準収載医薬品コード	4490028R1066	4490028R1066
規格単位 / 薬価	0.5%1g / 77.00円	0.5%1g / 77.00円
包装薬価	3,850円	7,700円
新発売日	2020年6月19日	2020年6月19日