

8～14歳用

お子様の貧血に マスチゲン錠

第2類医薬品

【特 長】

1. 体に吸収されやすい鉄分5mgを配合し、成長期のお子様の貧血を治します。
2. 貧血が原因の疲れ・だるさを治します。
3. お子様にも飲みやすい小さな錠剤です。
4. 飲み方は、続けやすい1日1錠です。
5. 1週間の服用で貧血に効き始めます。
6. めまい・朝の起きづらさ・思春期のお嬢様の貧血を治します。
7. 鳥レバー56gまたはホウレン草250g中に含まれる鉄分と同量の鉄分5mgを1錠中に配合しています。
8. 鉄分の吸収を高めるレモン約2個分のビタミンC、赤血球を守るビタミンE、赤血球を造るビタミンB₁₂・葉酸を配合。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなります。

本剤を服用している間は、他の貧血用薬を服用しないで下さい。

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛



60錠入

マスチゲン錠8～14歳用

3. 服用後、便秘、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法・用量に関連する注意

1. 貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根気よく服用して下さい。詳しくは薬剤師・登録販売者にご相談下さい。
2. 本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。
3. 2週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。
4. 錠剤の色が落ちることがありますので、濡れた手で錠剤を触らないで下さい。手に触れた錠剤は、容器に戻さないで下さい。
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- 6 容器内には乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。

【効 能】

貧血

【用法・用量】

8歳以上15歳未満、1日1回1錠、食後に飲んで下さい。朝昼晚いつ飲んでも構いません。8歳未満は服用しないで下さい。

【成 分】

1日量（1錠）中

成 分	含 量
溶性ピロリン酸第二鉄 （鉄として5mg）	39.75mg
ビタミンC	33.3mg
ビタミンE 酢酸エステル	6.7mg
ビタミンB ₁₂	25μg
葉酸	500μg

添加物：ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、クロスポビドン、ヒプロメロースフタル酸エステル、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウバロウ、赤色102号

【成分に関連する注意】

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により**便秘**になったり**便が黒くなる**ことがあります。

【使用期限】

3年